

MỤC LỤC

II. QUY TRÌNH XỬ LÝ RA HOA SẦU RIÊNG

1. GIAI ĐOẠN CÔI ĐỘT CUỐI CÙNG
 - 1.1. THỜI ĐIỂM TẠO MÀM GỐC
 - 1.2. THỜI ĐIỂM TẠO MÀM THÂN, LÁ
 - 1.3. THỜI ĐIỂM XIẾT NƯỚC, ĐẬY MŨ
2. GIAI ĐOẠN XỬ LÝ KÍCH RA HOA
 - 2.1. THỜI ĐIỂM PHUN PACLOBUTRAZOL
 - 2.2. THỜI ĐIỂM CẮT TỈA CÀNH BƠI
 - 2.3. THỜI ĐIỂM PHUN KÍCH THÍCH PHÂN HÓA MÀM HOA
 - 2.4. THỜI ĐIỂM RA HOA, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT SỰ RA HOA VÀ LƯU Ý
3. CÁC SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT
4. QUY TRÌNH ÁP DỤNG SẢN PHẨM TỔNG HỢP
5. GIẢI PHÁP KHI THỜI TIẾT BẤT LỢI TRONG QUY TRÌNH XỬ LÝ RA HOA

II. QUY TRÌNH XỬ LÝ RA HOA SẦU RIÊNG

1. GIAI ĐOẠN CÔI ĐỘT CUỐI CÙNG

1.1. THỜI ĐIỂM TẠO MÀM GỐC

- Khi cặp lá đầu tiên mở bung đều và cặp lá thứ 2 và thứ 3 chuẩn bị bung thì tiến hành rải phân tạo mầm gốc.
- Loại phân tạo mầm gốc: Dùng Lân Long Thành, Lân Malay, Lân P500, Phân NPK 9-25-17,...
- Lưu ý: tưới đẫm nước để cây hấp thụ phân lân nhanh nhất.

1.2. THỜI ĐIỂM TẠO MÀM THÂN, LÁ

- Tạo mầm trong thân: Khi cặp lá thứ hai mở bung đều, tiến hành phun thuốc tạo mầm trong thân cành (phun kỹ và ướm đẫm 2 bên cành – vị trí có mầm ngủ). Phun lặp lại sau 5 ngày.

- Tạo mầm lá: Khi cả ba cặp lá mở bung đều, tiến hành phun thuốc tạo mầm lá (Phun ướm đều mặt trong và ngoài lá). Phun lặp lại sau 7 ngày.

1.3. THỜI ĐIỂM XIẾT NƯỚC, ĐẬY MŨ

- Khi lá lựa chuyển sang già, giảm lượng nước tưới để mô trồng được khô ráo. Tiến hành xiết nước trong mương khoảng 1 tuần trước khi dậy mũ.

- Khi lá đã già thuần thực, tiến hành kéo mũ dậy gốc. Lưu ý, trùm kín tới dưới đáy hộc.

