

V. QUY TRÌNH CHĂM SÓC TRÁI TỪ 20 NSĐT ĐẾN THU HOẠCH

3. GIỐNG MUSANGKING

- 3.1. GIAI ĐOẠN 20 NSĐT ĐẾN 40 NSĐT
- 3.2. GIAI ĐOẠN 40 NSĐT ĐẾN 70 NSĐT
- 3.3. GIAI ĐOẠN 70 NSĐT ĐẾN THU HOẠCH
- 3.4. QUY TRÌNH BÓN PHÂN NUÔI TRÁI
- 3.5. QUY TRÌNH PHUN THUỐC SÂU RẦY BỆNH
- 3.6. QUY TRÌNH PHUN THUỐC DƯỠNG TRÁI
- 3.7. GIẢI PHÁP CHỐNG RỤNG SINH LÝ
- 3.8. GIẢI PHÁP CÂN DẮNG TRÁI – NỞ HỘC – CHẮC GAI
- 3.9. GIẢI PHÁP PHÒNG TRỪ RỆP SÁP – SÂU ĐỤC TRÁI
- 3.10. GIẢI PHÁP CHỐNG ÚNG – THỐI TRÁI
- 3.11. GIẢI PHÁP THỨC TĂNG TRỌNG LƯỢNG TRÁI VÀ LÊN CƠM NHANH
- 3.12. CÁC SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT
- 3.13. QUY TRÌNH ÁP DỤNG SẢN PHẨM TỔNG HỢP

V. QUY TRÌNH CHĂM SÓC TRÁI TỪ 20 NSĐT ĐẾN THU HOẠCH

3. GIỐNG MUSANGKING

3.11. GIẢI PHÁP THỨC TĂNG TRỌNG LƯỢNG TRÁI VÀ LÊN CƠM NHANH

- Giai đoạn từ 40 NSĐT – 70 NSĐT: Thời kỳ tăng trưởng nhanh của trái, để cây hấp thu đủ dinh dưỡng từ gốc, có thể bón phân hấp thu nhanh NPK 21-21-21 để mau chóng thúc trái nở hộc, cân dáng trái và nặng ký.

- Giai đoạn từ 70 NSĐT – thu hoạch: Thời kỳ trái lên cơm, để cây hấp thu đủ dinh dưỡng từ gốc, có thể bón phân hấp thu nhanh NPK 21-21-21 để mau chóng thúc trái nở hộc, cân dáng trái và nặng ký. Đồng thời phun thêm Silic-Kali trực tiếp vào trái để trái nặng ký, nở hộc và lên cơm.