

V. QUY TRÌNH CHĂM SÓC TRÁI TỪ 20 NSĐT ĐẾN THU HOẠCH

1. GIỐNG MONTHONG

- 1.1. GIAI ĐOẠN 20 NSĐT ĐẾN 55 NSĐT
- 1.2. GIAI ĐOẠN 55 NSĐT ĐẾN 85 NSĐT
- 1.3. GIAI ĐOẠN 85 NSĐT ĐẾN THU HOẠCH
- 1.4. QUY TRÌNH BÓN PHÂN NUÔI TRÁI
- 1.5. QUY TRÌNH PHUN THUỐC SÂU RẦY BỆNH
- 1.6. QUY TRÌNH PHUN THUỐC DƯỠNG TRÁI
- 1.7. GIẢI PHÁP CHỐNG RỤNG SINH LÝ
- 1.8. GIẢI PHÁP CÂN DẮNG TRÁI – NỖ HỘC – CHẮC GAI
- 1.9. GIẢI PHÁP PHÒNG TRỪ RỆP SÁP – SÂU ĐỤC TRÁI
- 1.10. GIẢI PHÁP CHỐNG ÚNG – THỐI TRÁI
- 1.11. GIẢI PHÁP THÚC TĂNG TRỌNG LƯỢNG TRÁI VÀ LÊN CƠM NHANH
- 1.12. CÁC SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT
- 1.13. QUY TRÌNH ÁP DỤNG SẢN PHẨM TỔNG HỢP

V. QUY TRÌNH CHĂM SÓC TRÁI TỪ 20 NSĐT ĐẾN THU HOẠCH

1. GIỐNG MONTHONG

1.2. GIAI ĐOẠN 55 NSĐT ĐẾN 85 NSĐT

- Đặc điểm: Đây là thời điểm trái sầu riêng tăng nhanh kích thước lẫn trọng lượng trái.

- Trong thời điểm này, là giai đoạn trái có tốc độ tăng trưởng rất nhanh mỗi ngày. Vì vậy, nên cần cung cấp đủ dinh dưỡng cho trái lớn đồng đều. Phun trực tiếp vào trái SILIC – KALI để trái được cân dáng, nở hộc và chắc gai.

- Kiểm soát tốt đợt lúc này giúp trái không bị cạnh tranh dinh dưỡng dẫn đến phát triển méo mó, dẹt hộc.