

MỤC LỤC

II. QUY TRÌNH XỬ LÝ RA HOA SẦU RIÊNG

1. GIAI ĐOẠN CỚI ĐỌT CUỐI CÙNG
 - 1.1. THỜI ĐIỂM TẠO MÀM GỐC
 - 1.2. THỜI ĐIỂM TẠO MÀM THÂN, LÁ
 - 1.3. THỜI ĐIỂM XIẾT NƯỚC, ĐẬY MŨ
2. GIAI ĐOẠN XỬ LÝ KÍCH RA HOA
 - 2.1. THỜI ĐIỂM PHUN PACLOBUTRAZOL
 - 2.2. THỜI ĐIỂM CẮT TỈA CÀNH BƠI
 - 2.3. THỜI ĐIỂM PHUN KÍCH THÍCH PHÂN HÓA MÀM HOA
 - 2.4. THỜI ĐIỂM RA HOA, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT SỰ RA HOA VÀ LƯU Ý
3. CÁC SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT
4. QUY TRÌNH ÁP DỤNG SẢN PHẨM TỔNG HỢP
5. GIẢI PHÁP KHI THỜI TIẾT BẤT LỢI TRONG QUY TRÌNH XỬ LÝ RA HOA

II. QUY TRÌNH XỬ LÝ RA HOA SẦU RIÊNG

2. GIAI ĐOẠN XỬ LÝ KÍCH RA HOA

2.1. THỜI ĐIỂM PHUN PACLOBUTRAZOL

- Sau đậy mũ, tiến hành phun Paclobutrazol ngay. Phun ướt trong thân cành, phun kỹ hai bên mặt cành. Có thể phun lặp lại với liều lượng giảm $\frac{1}{2}$ sau 5-7 ngày nếu thời tiết có mưa nhiều. Hạn chế phun Paclobutrazol ngoài lá khi không cần thiết.