

MỤC LỤC

II. QUY TRÌNH XỬ LÝ RA HOA SẦU RIÊNG

1. GIAI ĐOẠN CỚI ĐỌT CUỐI CÙNG
 - 1.1. THỜI ĐIỂM TẠO MÀM GỐC
 - 1.2. THỜI ĐIỂM TẠO MÀM THÂN, LÁ
 - 1.3. THỜI ĐIỂM XIẾT NƯỚC, ĐẬY MŨ
2. GIAI ĐOẠN XỬ LÝ KÍCH RA HOA
 - 2.1. THỜI ĐIỂM PHUN PACLOBUTRAZOL
 - 2.2. THỜI ĐIỂM CẮT TỈA CÀNH BƠI
 - 2.3. THỜI ĐIỂM PHUN KÍCH THÍCH PHÂN HÓA MÀM HOA
 - 2.4. THỜI ĐIỂM RA HOA, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT SỰ RA HOA VÀ LƯU Ý
3. CÁC SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT
4. QUY TRÌNH ÁP DỤNG SẢN PHẨM TỔNG HỢP
5. GIẢI PHÁP KHI THỜI TIẾT BẤT LỢI TRONG QUY TRÌNH XỬ LÝ RA HOA

II. QUY TRÌNH XỬ LÝ RA HOA SẦU RIÊNG

2. GIAI ĐOẠN XỬ LÝ KÍCH RA HOA

2.4. THỜI ĐIỂM RA HOA,

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT SỰ RA HOA VÀ LƯU Ý

- Sau khi phun kích thích phân hóa mầm hoa từ 20-25 ngày, mắt cua sẽ nhú và phát triển thành chùm hoa.

- Thời tiết tốt, gió thổi một chiều và lượng mưa ít sẽ thúc đẩy việc ra hoa nhanh chóng.

- Dấu hiệu nhận biết sự ra hoa: Bộ lá sẽ sụp màu và mất sức trương nước trong buổi sáng đến trưa. Bên trong cành, các điểm sáng mắt cua hình thành.

- Lưu ý: Trong thời điểm các điểm sáng mắt cua hình thành, cần tranh thủ phun thêm chất điều hòa sinh trưởng để thúc đẩy mắt cua nhanh chóng phát triển, tránh hiện tượng “thụt mắt cua”.

