

V. QUY TRÌNH CHĂM SÓC TRÁI TỪ 20 NSĐT ĐẾN THU HOẠCH

1. GIỐNG MONTHONG

- 1.1. GIAI ĐOẠN 20 NSĐT ĐẾN 55 NSĐT
- 1.2. GIAI ĐOẠN 55 NSĐT ĐẾN 85 NSĐT
- 1.3. GIAI ĐOẠN 85 NSĐT ĐẾN THU HOẠCH
- 1.4. QUY TRÌNH BÓN PHÂN NUÔI TRÁI
- 1.5. QUY TRÌNH PHUN THUỐC SÂU RẦY BỆNH
- 1.6. QUY TRÌNH PHUN THUỐC DƯỠNG TRÁI
- 1.7. GIẢI PHÁP CHỐNG RỤNG SINH LÝ
- 1.8. GIẢI PHÁP CÂN DẮNG TRÁI – NỖ HỘC – CHẮC GAI
- 1.9. GIẢI PHÁP PHÒNG TRỪ RỆP SÁP – SÂU ĐỤC TRÁI
- 1.10. GIẢI PHÁP CHỐNG ÚNG – THỐI TRÁI
- 1.11. GIẢI PHÁP THỨC TĂNG TRỌNG LƯỢNG TRÁI VÀ LÊN CƠM NHANH
- 1.12. CÁC SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT
- 1.13. QUY TRÌNH ÁP DỤNG SẢN PHẨM TỔNG HỢP

V. QUY TRÌNH CHĂM SÓC TRÁI TỪ 20 NSĐT ĐẾN THU HOẠCH

1. GIỐNG MONTHONG

1.4. QUY TRÌNH BÓN PHÂN NUÔI TRÁI

1.4.1. GIAI ĐOẠN 20 NSĐT ĐẾN 55 NSĐT

- 20-25 NSĐT: Cần bón hữu cơ + Tưới dưỡng rễ dạng lỏng.
- 35 NSĐT: Cần bón ROOT 9-9-9
- 45 NSĐT: Cần bón NPK 12-11-18/12-12-17 + CANXI-SILIC-MAGIE
- 55 NSĐT: Cần bón phân hấp thu nhanh NPK 21-21-21 để thúc cây cung cấp dinh dưỡng bước sang giai đoạn trái tăng trưởng nhanh.

1.4.2. GIAI ĐOẠN 55 NSĐT ĐẾN 85 NSĐT

- 65 NSĐT: Cần bón NPK 16-16-16 cho cây tơ và NPK 20-10-10 cho cây lão.
- 75 NSĐT: Cần bón 16-16-16 + ROOT 9-9-9
- 85 NSĐT: Cần bón phân hấp thu nhanh NPK 21-21-21 để thúc cây cung cấp dinh dưỡng bước sang giai đoạn trái tăng trưởng vào cơm nhanh.

1.4.3. GIAI ĐOẠN 85 NSĐT ĐẾN THU HOẠCH

- 95-100 NSĐT: Bón NPK 12-11-18/ 12-12-17 + Tưới dưỡng rễ dạng lỏng để trái lên cơm tốt và bộ rễ được khỏe.
- 105 NSĐT: Có thể bón thêm NPK 12-11-18/ 12-12-17 để trái mau chóng lên cơm.

