

MỤC LỤC

I. NUÔI COI ĐỘT SẦU RIÊNG

1. GIAI ĐOẠN NHÚ MŨI GIÁO
2. GIAI ĐOẠN MỞ LÁ
3. GIAI ĐOẠN LÁ LỰA – GIÀ
4. QUY TRÌNH PHUN THUỐC SÂU RẦY BỆNH
5. QUY TRÌNH PHUN PHÂN BÓN LÁ
6. QUY TRÌNH BÓN PHÂN
7. CÁC SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT
8. QUY TRÌNH ÁP DỤNG SẢN PHẨM TỔNG HỢP

I. NUÔI COI ĐỘT SẦU RIÊNG

4. QUY TRÌNH PHUN THUỐC SÂU RẦY BỆNH

4.1. Các đối tượng sâu rầy quan trọng

- Rầy xanh: chích hút làm quéo lá non và rụng lá
- Câu câu xanh (gây hại ban đêm): cắn phá gây lũng lỗ trên lá, gây hại mạnh khi coi đột đang mở lá và lựa.
- Các loại sâu ăn lá.

4.2. Các đối tượng nấm bệnh gây hại quan trọng

- Bệnh quan trọng nhất là cháy lá do các nấm: Phytophthora, Colletotrichum, Rhizoctonia,.. và sự xâm nhập của vi khuẩn.
- Nấm hồng, rỉ sắt.

4.3. Quy trình phun thuốc sâu rầy.

- Thời điểm bắt đầu phun thuốc sâu rầy bảo vệ coi đột: Khi mũi giáo vừa hình thành.

- Chọn sản phẩm thuốc sâu rầy có các đặc tính sau: Có độ lưu dẫn cao, độ xông hơi mạnh.

- Các loại thuốc có thể phối trộn để đạt được các kết quả: Tiêu diệt nhanh, chống lột xác và gây ung trứng, xua đuổi tốt, có tính vị độc khi côn trùng chích hút và lưu dẫn theo độ vươn dài của cơi đọt.

- Thời điểm phun lặp lại: Nếu thời tiết tốt có thể 8-10 ngày phun lại, nếu trời mưa nhiều làm rửa trôi thuốc có thể phun lặp lại sau 6-7 ngày.

4.4. Quy trình phun thuốc trừ bệnh

- Thời điểm bắt đầu phun thuốc trừ bệnh bảo vệ cơi đọt: Khi lá lụa – già.

- Chọn sản phẩm thuốc trừ bệnh có các đặc tính sau: Có độ lưu dẫn trong toàn bộ lá, độ thấm sâu và bám dính tốt.

- Các loại thuốc có thể phối trộn để đạt được các kết quả: Chặn đứng hiện tượng cháy lá phát sinh từ mép lá và chót lá. Tẩy mạnh các nấm bề mặt lá sau khi sử dụng các sản phẩm phân bón lá thúc đẩy cơi đọt phát triển.

- Thời điểm phun lặp lại: Phun lặp lại sau 4-5 ngày nếu có hiện tượng bất lợi của thời tiết như độ ẩm cao do mưa dầm hoặc sương mù ban đêm.