

MỤC LỤC

II. QUY TRÌNH XỬ LÝ RA HOA SẦU RIÊNG

1. GIAI ĐOẠN CÔI ĐỌT CUỐI CÙNG
 - 1.1. THỜI ĐIỂM TẠO MÀM GỐC
 - 1.2. THỜI ĐIỂM TẠO MÀM THÂN, LÁ
 - 1.3. THỜI ĐIỂM XIẾT NƯỚC, ĐẬY MŨ
2. GIAI ĐOẠN XỬ LÝ KÍCH RA HOA
 - 2.1. THỜI ĐIỂM PHUN PACLOBUTRAZOL
 - 2.2. THỜI ĐIỂM CẮT TỈA CÀNH BƠI
 - 2.3. THỜI ĐIỂM PHUN KÍCH THÍCH PHÂN HÓA MÀM HOA
 - 2.4. THỜI ĐIỂM RA HOA, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT SỰ RA HOA VÀ LƯU Ý
3. CÁC SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT
4. QUY TRÌNH ÁP DỤNG SẢN PHẨM TỔNG HỢP
5. GIẢI PHÁP KHI THỜI TIẾT BẤT LỢI TRONG QUY TRÌNH XỬ LÝ RA HOA

II. QUY TRÌNH XỬ LÝ RA HOA SẦU RIÊNG

5. GIẢI PHÁP KHI THỜI TIẾT BẤT LỢI TRONG QUY TRÌNH XỬ LÝ RA HOA

5.1. SAU QUÁ 30 NGÀY, CÂY CHƯA RA HOA

- Nếu trong suốt thời gian xử lý ra hoa trong 30 ngày gặp mưa nhiều và liên tục, cây chưa xuất hiện mắt cua hoặc mắt cua ra yếu. Có thể phun lặp lại Paclobutrazol với liều lượng *TOBAJUM 20WP 500GR + PACLO 15SC 500ML/200 LÍT NƯỚC*, phun ướt thân cành. Sau khi phun lặp lại Paclobutrazol thì tiếp tục phun kích thích phân hóa mầm hoa.

- Trường hợp “tiết bông” yếu, thì vẫn có thể áp dụng cách trên để hỗ trợ cây dễ dàng ra hoa hơn.

5.2. SAU QUA 50 NGÀY CÂY CHƯA RA HOA

- Nếu trong suốt thời gian xử lý ra hoa trong 50 ngày gặp mưa nhiều và liên tục, cây chưa xuất hiện mắt cua hoặc mắt cua ra yếu. Và sau khi đã xử lý phun lặp lại Paclobutrazol ở thời điểm 30 ngày, thì có thể tham khảo biện pháp sau:

+ Tiến hành dỡ mũ và tưới nước đẫm, sau đó bón phân *NPK 12-11-18/12-12-17* và tiếp tục tưới cho tan phân cho cây hấp thụ.

+ Kéo mũ đậy trở lại và tiếp tục phun kích thích phân hóa mầm hoa.

- Thông thường, nếu gặp “tiết bông” yếu làm cây khó ra hoa sau 50-60 ngày từ ngày đậy mũ, thì có thể kiên trì duy trì biện pháp trên để đón “tiết bông” mạnh hơn kế tiếp.

