

V. QUY TRÌNH CHĂM SÓC TRÁI TỪ 20 NSĐT ĐẾN THU HOẠCH

1. GIỐNG MONTHONG

- 1.1. GIAI ĐOẠN 20 NSĐT ĐẾN 55 NSĐT
- 1.2. GIAI ĐOẠN 55 NSĐT ĐẾN 85 NSĐT
- 1.3. GIAI ĐOẠN 85 NSĐT ĐẾN THU HOẠCH
- 1.4. QUY TRÌNH BÓN PHÂN NUÔI TRÁI
- 1.5. QUY TRÌNH PHUN THUỐC SÂU RẦY BỆNH
- 1.6. QUY TRÌNH PHUN THUỐC DƯỠNG TRÁI
- 1.7. GIẢI PHÁP CHỐNG RỤNG SINH LÝ
- 1.8. GIẢI PHÁP CÂN DẮNG TRÁI – NỖ HỘC – CHẮC GAI
- 1.9. GIẢI PHÁP PHÒNG TRỪ RỆP SÁP – SÂU ĐỤC TRÁI
- 1.10. GIẢI PHÁP CHỐNG ÚNG – THỐI TRÁI
- 1.11. GIẢI PHÁP THÚC TĂNG TRỌNG LƯỢNG TRÁI VÀ LÊN CƠM NHANH
- 1.12. CÁC SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT
- 1.13. QUY TRÌNH ÁP DỤNG SẢN PHẨM TỔNG HỢP

V. QUY TRÌNH CHĂM SÓC TRÁI TỪ 20 NSĐT ĐẾN THU HOẠCH

1. GIỐNG MONTHONG

1.7. GIẢI PHÁP CHỐNG RỤNG SINH LÝ

- Thời điểm chấm dứt rụng sinh lý từ thời điểm 55 NSĐT.
- Các nguyên nhân gây rụng trái mạnh: Sốc nhiệt độ, cây đi đọt, thúc phân quá liều lượng và sốc nước.
- Để hạn chế việc rụng trái, chúng ta cần:
 - + Bón phân đầy đủ và cân đối ở giai đoạn trái trước 55 NSĐT.
 - + Chặn đọt tuyệt đối giai đoạn trái nhỏ.

+ Tưới nước vừa đủ ẩm, nếu gặp mưa bão có thể rút nước cạn trong mương để thoát nước tốt.

+ Cần phun các sản phẩm giúp cuống trái dai, cứng chắc như Canxi và Silic-Kali.

+ Nếu hiện tượng rụng trái đột ngột và quá nhanh thì có thể phun thêm Paclo 15SC với liều lượng 100ml/200 lít nước, phun trực tiếp vào trái từ 1-2 lần.

