

V. QUY TRÌNH CHĂM SÓC TRÁI TỪ 20 NSĐT ĐẾN THU HOẠCH

3. GIỐNG MUSANGKING

- 3.1. GIAI ĐOẠN 20 NSĐT ĐẾN 40 NSĐT
- 3.2. GIAI ĐOẠN 40 NSĐT ĐẾN 70 NSĐT
- 3.3. GIAI ĐOẠN 70 NSĐT ĐẾN THU HOẠCH
- 3.4. QUY TRÌNH BÓN PHÂN NUÔI TRÁI
- 3.5. QUY TRÌNH PHUN THUỐC SÂU RẦY BỆNH
- 3.6. QUY TRÌNH PHUN THUỐC DƯỠNG TRÁI
- 3.7. GIẢI PHÁP CHỐNG RỤNG SINH LÝ
- 3.8. GIẢI PHÁP CÂN DÁNG TRÁI – NỞ HỘC – CHẮC GAI
- 3.9. GIẢI PHÁP PHÒNG TRỪ RỆP SÁP – SÂU ĐỤC TRÁI
- 3.10. GIẢI PHÁP CHỐNG ÚNG – THỐI TRÁI
- 3.11. GIẢI PHÁP THÚC TĂNG TRỌNG LƯỢNG TRÁI VÀ LÊN CƠM NHANH
- 3.12. CÁC SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT
- 3.13. QUY TRÌNH ÁP DỤNG SẢN PHẨM TỔNG HỢP

V. QUY TRÌNH CHĂM SÓC TRÁI TỪ 20 NSĐT ĐẾN THU HOẠCH

3. GIỐNG MUSANGKING

3.8. GIẢI PHÁP CÂN DÁNG TRÁI – NỞ HỘC – CHẮC GAI

- Để trái phát triển đồng đều, cân dáng trái và chắc gai, ở mỗi giai đoạn phát triển cần bổ sung các dinh dưỡng quan trọng như Canxi và Silic-Kali.

- Giai đoạn 20 NSĐT – 40 NSĐT: phun với liều lượng 100ml/200 lít nước.

- Giai đoạn 40 NSĐT – Thu hoạch: phun với liều lượng 200 - 250ml/200 lít nước.

- Đồng thời, dưới gốc bổ sung đầy đủ phân bón. Nếu trường hợp trái nhỏ ký, hoặc hơi méo trái, có thể bón phân hấp thu nhanh NPK 21-21-21 để mau chóng thúc trái nở hột, cân dáng trái và nặng ký.

