

V. QUY TRÌNH CHĂM SÓC TRÁI TỪ 20 NSĐT ĐẾN THU HOẠCH

1. GIỐNG MONTHONG

- 1.1. GIAI ĐOẠN 20 NSĐT ĐẾN 55 NSĐT
- 1.2. GIAI ĐOẠN 55 NSĐT ĐẾN 85 NSĐT
- 1.3. GIAI ĐOẠN 85 NSĐT ĐẾN THU HOẠCH
- 1.4. QUY TRÌNH BÓN PHÂN NUÔI TRÁI
- 1.5. QUY TRÌNH PHUN THUỐC SÂU RẦY BỆNH
- 1.6. QUY TRÌNH PHUN THUỐC DƯỠNG TRÁI
- 1.7. GIẢI PHÁP CHỐNG RỤNG SINH LÝ
- 1.8. GIẢI PHÁP CÂN DẮNG TRÁI – NỖ HỘC – CHẮC GAI
- 1.9. GIẢI PHÁP PHÒNG TRỪ RỆP SÁP – SÂU ĐỤC TRÁI
- 1.10. GIẢI PHÁP CHỐNG ÚNG – THỐI TRÁI
- 1.11. GIẢI PHÁP THÚC TĂNG TRỌNG LƯỢNG TRÁI VÀ LÊN CƠM NHANH
- 1.12. CÁC SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT
- 1.13. QUY TRÌNH ÁP DỤNG SẢN PHẨM TỔNG HỢP

V. QUY TRÌNH CHĂM SÓC TRÁI TỪ 20 NSĐT ĐẾN THU HOẠCH

1. GIỐNG MONTHONG

1.8. GIẢI PHÁP CÂN DẮNG TRÁI – NỖ HỘC – CHẮC GAI

- Để trái phát triển đồng đều, cân dáng trái và chắc gai, ở mỗi giai đoạn phát triển cần bổ sung các dinh dưỡng quan trọng như Canxi và Silic-Kali.

- Giai đoạn 20 NSĐT – 55 NSĐT: phun với liều lượng 100ml/200 lít nước.

- Giai đoạn 55 NSĐT – Thu hoạch: phun với liều lượng 200 - 250ml/200 lít nước.

- Đồng thời, dưới gốc bổ sung đầy đủ phân bón. Nếu trường hợp trái nhỏ ký, hoặc hơi méo trái, có thể bón phân hấp thu nhanh NPK 21-21-21 để mau chóng thúc trái nở hột, cân dáng trái và nặng ký.

