

MỤC LỤC

III. QUY TRÌNH CHĂM SÓC HOA

(TỪ MẮT CUA ĐẾN TRƯỚC XỔ NHỤY)

1. QUY TRÌNH PHUN THUỐC SÂU RẦY BỆNH
2. QUY TRÌNH PHUN THUỐC DƯỠNG HOA
3. QUY TRÌNH BÓN PHÂN NUÔI HOA
4. THỜI ĐIỂM TỈA HOA
5. THỜI ĐIỂM XỬ LÝ KIỂM SOÁT CHẶN ĐỘT
6. THỜI ĐIỂM XỬ LÝ BỆNH GỐC
7. CÁC SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT
8. QUY TRÌNH ÁP DỤNG SẢN PHẨM TỔNG HỢP
9. GIẢI PHÁP KÉO CƠI ĐỘT TRONG QUY TRÌNH CHĂM SÓC HOA (NÂNG CAO)
10. NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM CỦA CHÙM HOA KHỎE MẠNH
11. LƯU Ý HIỆN TƯỢNG RỤNG HOA
12. LƯU Ý VỀ VIỆC ĐỀ HOA TRÊN CÀNH NGON
13. LƯU Ý VỀ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT HOA SẮP XỔ NHỤY

III. QUY TRÌNH CHĂM SÓC HOA

(TỪ MẮT CUA ĐẾN TRƯỚC XỔ NHỤY)

9. GIẢI PHÁP KÉO CƠI ĐỘT TRONG QUY TRÌNH CHĂM SÓC HOA (NÂNG CAO)

- Có thể kéo coi đột khi gặp “tiết đột” ở giai đoạn cây vừa ra mắt cua. Nếu “tiết đột” yếu hoặc không có thì không nên thúc phân hoặc phun thuốc kéo đột.
- Sau thời điểm hoa đạt từ 5-7cm thì không nên kéo đột.

9.1. KÉO ĐỘT

- Thúc phân NPK 30-10-10, 25-5-5, 20-20-15 để cây nhanh chóng vọt đọt.
- Sau 7 ngày thúc thêm phân hấp thu nhanh chóng NPK 21-21-21.
- Sau 7 ngày rải hữu cơ nở và tưới dưỡng rễ dạng lỏng.
- Hoa trước xổ nhụy 2 tuần, rải Canxi-Silic-Magie và tưới KALI PHOS dưới vùng rễ.

9.2. THÚC GIÀ LÁ VÀ CHẶN ĐỌT TỪ GIAI ĐOẠN HOA TRƯỚC XỔ NHỤY 2 TUẦN

- Phun thuốc kiểm soát chặn đọt khi coi đọt được từ 1 cặp lá mở bung đều.
- Phun lặp lại sau 5 ngày.
- Phun thêm cử chặn đọt khi hoa bắt đầu xổ nhụy.

